



LINEA PHOS-PHYTOS

FosforAmin L. con amminoacidi

BIO-ATTIVATORE ORGANO-MINERALE





FosforAmin L. con amminoacidi

BIO-ATTIVATORE ORGANO-MINERALE

	p/p	p/v	gr/lt
Azoto (N) totale	3 %	3,77 %	37,7
di cui: Azoto (N) organico	1 %	1,25 %	12,5
Azoto (N) ammoniacale	2 %	2,51 %	25,1
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	33 %	41,48 %	414,8
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro e acqua	33 %	41,48 %	414,8
Carbonio (C) organico di origine biologica	3 %	3,77 %	37,7

PARAMETRI FISICO-CHIMICI

pH di una soluzione al 1%: 4,2

Peso specifico a 20 °C: 1,257 kg/lt

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione liquida a base di **fosforo, amminoacidi e peptidi a basso peso molecolare altamente assimilabili** da parte dei tessuti delle foglie e delle radici e velocemente traslocabili all'interno della pianta attraverso i vasi conduttori.

La forma del fosforo presente migliora l'assorbimento degli elementi nutritivi con cui si associa garantendone l'assimilazione anche in presenza di interruzione del flusso linfatico dovuto ad attacchi fungini o alterazioni fisiologiche (azione vaso-dilatatrice). Mantiene la pianta compatta con gli internodi più corti e la rende più resistente alle avversità e più produttiva. **Migliora l'attività vegetativa, la fioritura, l'allegagione e la maturazione**, garantendo una maggiore produzione e un più elevato livello qualitativo delle produzioni.

Coadiuvante ed **esalta l'attività dei fungicidi con cui si associa, migliorando lo stato sanitario della pianta.**

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Colture arboree (kiwi, agrumi, melo, pero, drupacee, olivo): in applicazione fogliare dalla ripresa vegetativa alla fase di frutto ingrossato ripetere 3-4 volte alla dose di 3 kg/ha, oppure in fertirrigazione alla dose di 10-15 kg/ha.

Vite: in applicazione fogliare durante tutto il ciclo ripetere 4-6 interventi a 3 kg/ha in associazione con Cymoxanil, Mancozeb e Poltiglie bordolesi non preparate artigianalmente, stabili e miscibili e con tutti i più comuni antiparassitari.

Fragola, melone, anguria, pomodoro, patata, verdure a foglia anche per la IV gamma, melanzana, peperone, cavoli: durante tutto il ciclo produttivo in applicazione fogliare alla dose di 2,5-3 kg/ha, o in fertirrigazione alla dose di 1 kg per 1.000 mq.

Floricoltura e vivaismo: concimazioni fogliari a 250 gr/hl o con irrigazioni a 5-10 gr per mq.

Si consiglia di impiegare 500-1.000 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione ma il prodotto può essere utilizzato anche a concentrazioni superiori (1%).

MISCIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.

Su alcune specie (susino, floricole, ...) e varietà di nettarine non associare con prodotti a base di rame.

Si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità.

CONFEZIONI: Flacone da kg 1 · Tanichetta da kg 5 · Tanica da kg 25