



PROTEGGE LA PIANTA DAI DANNI CAUSATI DALLE GELATE

SPECIALI PER APPLICAZIONE FOGLIARE

Fructi d'Or PK 5-40 L.

**CONCIME CE · SOSPENSIONE DI CONCIME PK 5-40
"A BASSO TENORE DI CLORO"**





Fructi d'Or PK 5-40 L.

CONCIME CE · SOSPENSIONE DI CONCIME PK 5-40 · “A BASSO TENORE DI CLORO”

	p/p	p/v	gr/lt
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	5 %	7,95 %	79,5
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua.....	40 %	63,60 %	636,0

PARAMETRI FISICO-CHIMICI

pH tal quale: 6,90

Peso specifico a 20 °C: 1,590 kg/lt

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Formulazione liquida con elevata concentrazione di fosforo e potassio caratterizzata da una completa e veloce assimilabilità degli elementi nutritivi contenuti. Grazie alla fonte esclusiva di fosforo (acido fosforoso) e potassio (**formiato di potassio**) contenuta, **Fructi d'Or PK 5-40** induce la formazione di **tessuti più consistenti**, più resistenti alle avversità ambientali e aumenta il numero di frutti allegati. Incrementa il calibro dei frutti, aumenta la produzione e migliora le caratteristiche qualitative delle produzioni (residuo secco, colore, aromaticità, serbevolezza, contenuto zuccherino, ...). Distribuito per via fogliare in pre-fioritura delle **colture arboree, aiuta a proteggere le piante dai danni causati dalle gelate**, (abbassamenti termici fino a 3-4 gradi sotto zero) oppure a sciogliere più velocemente il ghiaccio quando formato. Nelle **orticole consente un miglior equilibrio tra fase vegetativa e riproduttiva**, contiene gli eccessi di vigoria della vegetazione e stimola la fioritura e l'allegagione.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Pomacee, actinidia, agrumi, vite da vino e da tavola, piccoli frutti: in applicazione fogliare alla formazione dei fiori in **pre-fioritura (nel pero e nel melo nella fase di “orecchiette di topo”)**, alla piena fioritura, durante l'accrescimento frutti e all'invasatura, ripetendo l'intervento 4-5 volte alla dose di 2,5-3 kg/ha.

Drupacee: in applicazione fogliare alla fioritura per prevenire forti gelate alla dose di 5 kg/ha, dopo l'allegagione per incrementare la “pezzatura” dei frutti e nelle fasi finali al fine di migliorare le caratteristiche qualitative alla dose di 2,5-3 kg/ha.

Colture orticole (peperone, pomodoro, melone, anguria, carota): in applicazione fogliare dalla fase di pre-fioritura (contenimento degli eccessi vegetativi) alla fase di frutto ingrossato per mantenere le piante “compatte” e produttive alla dose di 2,5-3 kg/ha.

Colture floricole ed ornamentali: in applicazione fogliare durante il ciclo vegetativo per tenere in equilibrio le piante prima della fioritura alla dose di 200-250 gr/hl.

Si consiglia di impiegare 500-1.000 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione ma il prodotto può essere utilizzato anche a concentrazioni superiori.

Il prodotto si può impiegare anche in fertirrigazione nelle stesse epoche alla dose di 10-15 kg/ha.

MISCIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con altri formulati ma si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità.

CONFEZIONI: Flacone da kg 1 · Tanichetta da kg 6 · Tanica da kg 30 · Cisternetta da kg 1.600